

Preguntas sobre displasia de cadera

Publicado por Fausto en CONTENIDOSPerros, 7 September, 2005 @1:31 am

¿A qué edad se diagnostica?

Nosotros en nuestras revisiones periódicas de cachorros detectamos pequeños problemas de movimiento y es entonces cuando decidimos realizar radiografías para detectar posible displasia. Esto lo iniciamos a los 3-4 meses y si es un cachorro sin problemas pero de razas sensibles sobre los 6 meses realizamos radiografías y si todo es correcto al año de edad aproximadamente volvemos a realizar la radiografía.

Lo ideal es diagnosticarlo lo antes posible, pues así el tratamiento temprano nos evita problemas secundarios.

¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas son variables, desde un menor apoyo de las extremidades posteriores, desplazando el peso del animal a las extremidades anteriores, hasta tambaleo, mal apoyo e incluso cojera manifiesta.

En cachorros a veces lo diagnosticamos por inhibirse en el juego o rechazar el ejercicio.

¿Qué perros están más expuestos a padecerla?

Las razas que están más expuestas son aquellas que tienen un desarrollo muy rápido y ponen peso tan rápidamente que no les da tiempo a fortalecer sus articulaciones y huesos.

Estas suelen ser razas de gran tamaño cuando son adultos. Ej.: Pastor Alemán, Labrador, Rottweiler, Mastines, Terranova, etc.…

Para estas razas, los clubes respectivos exigen un certificado libre de displasia para poder dedicarlos a reproducción. En estos casos después del año de edad los veterinarios autorizados hacemos una radiografía oficial, que deben reunir una serie de requisitos para que después el organismo competente (AVEPA (asociación De veterinario especialista en animales de compañía), AMVAC (asociación madrileña de veterinarios de animales de compañía, O el Dr. Bras en caso del P. Alemán), lea las radiografías y emita su certificado con su diagnóstico, posteriormente los clubes dan el certificado de libre de displasia a estos animales y podrán dedicarse a la reproducción.

Sin este certificado esos animales no podrán dedicarse a la reproducción y en todo caso sus hijos no podrán registrarse en el L.O.E (Libro de Origen Español).

¿Se puede evitar? ¿Cómo?

Podemos evitarlo haciendo que los animales que tengan algún grado de displasia, sean razas puras o no, no se reproduzcan nunca. Para ello nosotros recomendamos a nuestros clientes con perros displásicos, no solo que no se reproduzcan sino que les realicen la castración, por lo que nunca llegaran a transmitir la displasia.

Cuando a un perro le diagnosticamos displasia el pronóstico y tratamiento varía mucho de unas clínicas a otras. En nuestro caso, somos más conservadores y menos alarmistas. No sacrificamos a ningún perro a no ser que el dueño así lo decida. Nosotros siempre recomendamos el tratamiento.

Nuestro tratamiento se basa en antiinflamatorios, antialgicos, condroprotectores, homeopáticos regeneradores musculares, aplicados intrarticularmente o por boca y fisioterapia con ejercicios moderados.

Con este tratamiento en la mayoría, mas del 80% de los casos, evitamos el tratamiento quirúrgico.

En los casos que no responden a este tratamiento conservador, proponemos diferentes tratamientos quirúrgicos que van desde la unión del pubis en edades tempranas hasta la prótesis de cadera en perros mayores de 12 meses.

Para realizar estas cirugías además de escoger el momento adecuado, debemos hacer un diagnostico muy preciso, escoger muy bien a los pacientes e informar a los clientes de todos los riesgos operatorios y postoperatorios que pueden producirse.

Con todo esto queremos decir que la mayoría de los animales con el tratamiento adecuado pueden tener una vida normal.

¿Si tenemos algún perro con esta enfermedad, qué debemos hacer?

Lo primero que hay que hacer es llevarlos al veterinario, para que este realice un correcto diagnostico lo antes posible y se comience con el tratamiento conservador cuando todavía son muy jóvenes.

Nunca debemos dedicarlos a la reproducción y deberíamos decidir la castración tanto en machos como en hembras.

¿Cuál es el remedio más eficaz contra la misma?

El remedio mas eficaz es la prevención, por un lado, como hemos indicado, no cruzando animales displásicos y después desde cachorritos no tenerlos enjaulados, darles ejercicios adecuados a cada momento de su desarrollo y realizar fisioterapia preventiva desde cachorros (nadar, andar sobre arena o césped, etc.). El juego con sus hermanos en terrenos apropiados con sol y lugares secos es el mejor remedio para evitar problemas de displasia en cachorros sanos.

¿Qué no es conveniente hacer?

Nunca es conveniente cruzar animales con displasia y tampoco es conveniente mantener en jaula a los cachorros especialmente en el primer mes de su vida, tampoco es conveniente mantenerlos en suelo resbaladizo ni someterlos a esfuerzos excesivos hasta que han cumplido su desarrollo natural.

Comentarios:

como puedo darle un tratamiento natural a mi perro que sufre de displasia de cadera es un rottweiler tiene 9 meses , lo que pasa que yo no sabia de esta enfermedad y asi me lo vendieron gente que es muy abusona y que crusa a sus perro asi , yo lo que quiero es darle una medicina alternativa a la que toma gracias y como me podrian ayudar

Comentario por Jesus javier ([EMAIL]), 4 December, 2007 @7:32 am

Nexo Centros Veterinarios

tengo undogo de burdeos y me an diagnosticado displasia,me han dicho que es urgente operar franko tiene 10 meses. he estado lyendo sus comentarios sobre los ratamientosque e requieren y me gustaria saber si se puee poner un tratamiento que no sea tan radical como una operacion. gracias por su atencion

Comentario por david melo ([EMAIL]), 1 November, 2008 @3:27 am

Mi rottweiller de 5 años tiene displasia de cadera grado 2 en pata izquierda y grado 1 en a derecha. Le dan Osteocart plus, pero a veces noto que levanta su pata izq., lo que sucede es que es muy activo, salta corre, y no puedo frenarlo de ninguna manera. Esta enfermedad por mas que este medicada empeora?, estoy muy asustada por mi bebe que es todo para mi. Por favor ayudenme que puedo hacer. gracias

Comentario por Natalia ([EMAIL]), 30 December, 2008 @5:36 pm

Hola,

Hoy estaba mi Golden de 5 meses jugando en el parque y un perro enorme ha saltado sobre ella, que estaba tendida en el suelo. Se ha levantado cojeando y luego se iba recuperando pero con un movimiento muy extraño, con el culo de un lado a otro. Además, no sé si es normal, pero nunca salta al sillón o a la cama, sino que se levanta en las patas traseras y luego "escala". Hasta ahora pensaba que era normal porque es sólo un cachorro, pero después de lo de hoy estoy realmente preocupada. Ya no puedo dejar de mirarla cuando voy detrás. Ella corre y juega siempre con otros perros, pero no sé si los cachorros lo hacen aunque tengan dolor.

Es normal que los cachorros de por si tengan un movimiento trasero peculiar?

Seguro que hoy ni dormiré así que de antemano les agradezco su respuesta

Comentario por Miriam ([EMAIL]), 14 January, 2009 @9:20 pm

HOLA: TENGO UNA PERRITA SCHNAUZER QUE TIENE 2 CRIAS. EL 7/05/09 VAN A CUMPLIR UN MES UNO NO CAMINA SE ARRASTRA CON SUS PATAS DELANTERAS. SI ES (DISPLACIA) SE LE PUEDE HACER UN TRATAMIENTO PARA CURARLA? O TENGO QUE RESIGNARME Y SACRIFICARLA? POR FAVOR DIGAMEN QUE HACER? VOY A ESPERAR SU RESPUESTA Y DESDE YA GRACIAS.

Comentario por CARLA ([EMAIL]), 28 April, 2009 @7:39 pm

HOLA, SOY ALE DE SAN FERNANDO PROV. DE BS AS.HOY LLEVAMOS A NUESTRO PERRO AL VETERINARIO Y NOS DIAGNOSTICO, DISPLASIA DE CADERAS GRADO 4 . ES UN ROTWEILLER, DE 10 MESES.Y ME DIJERON Q ES MUY PROBLABLE Q HAYA Q OPERARLO.MI PREGUNTA ES .SI ESTA OPERACION ES CONVENIENTE? ES COMO PARA TENER OTRA OPINION.DESDE YA GRACIAS.

Comentario por ALE ([EMAIL]), 21 May, 2009 @1:34 am